

当院での内視鏡検査時における抗凝固剤の取り扱いについて

・単独投与時の抗血栓薬の取り扱い

単独投与 \ 内視鏡検査	観察	生検	ポリペクミー
アスピリン	◎	○	○/ 3~5日休薬
チエノピリジン (プラビックス、 パナルジン等)	◎	○	ASA、CLZ置換 /5~7日休薬
チエノピリジン以外の 抗血小板薬	◎	○	1日休薬
ワルファリン	◎	○ 治療域	ヘパリン置換
ダビガトラン (プラザキサ等)	◎	○	ヘパリン置換

◎: 休薬不要 ○: 休薬不要で可能 ASA: アスピリン CLZ: シロスタゾール (プレタール等)

・多剤併用時の抗血栓薬の取り扱い

	アスピリン	チエノピリジン (プラビックス、 パナルジン等)	チエノピリジン 以外の抗血小板 薬	ワルファリン、 ダビガトラン (プラザキサ)
2剤併用	○/CLZ置換	5~7日休薬		
	○/CLZ置換		1日休薬	
	○/CLZ置換			ヘパリン置換
		ASA置換/CLZ置換	1日休薬	
		ASA置換/CLZ置換		ヘパリン置換
			CLZ継続/1日休薬	ヘパリン置換
3剤併用	○/CLZ置換	5~7日休薬		ヘパリン置換
	○/CLZ置換		1日休薬	ヘパリン置換
		ASA置換/CLZ置換	1日休薬	ヘパリン置換

○: 休薬不要で可能 ASA: アスピリン CLZ: シロスタゾール (プレタール等)

平成25年5月16日現在

瀧 消化器内科クリニック
瀧 智行
TEL: (0586) 47-7023